

Hej!

Takeda arbetar för en ökad kunskap och förståelse för ADHD. Vårt arbete utgår alltid från patientens behov, eftersom det är deras hälsa och livskvalitet som räknas i slutändan. Vår vision är att alla med ADHD, oavsett ålder, kön, etnicitet eller var man bor i landet, ska få tillgång till en tidig och likvärdig diagnos, individuellt anpassad behandling och en sammanhängande vård. Här i vårt nyhetsbrev lyfter vi upp aktuella ämnen kring ADHD för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

I detta nummer av "Nyheter från adhd i vården" kan du bland annat läsa om:

- Depression – en varningssignal för ADHD?
- Hur du kan ta del av patientfall tillsammans med oss.
- Att många unga vuxna avslutar sin ADHD-behandling.

Trevlig läsning



ADHD och depression

Är depression en varningssignal för ADHD? Den frågan togs upp av professor Anita Thapar under 9th World Congress on ADHD som hölls i Amsterdam. Hela 12,3% av patienter med depression har även ADHD¹.

På samma tema har vi på Takeda arrangerat ett webinar med Ulrika By, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin, om "ADHD och depression hos barn och unga".

Är du intresserad av att ta del av föreläsningen med Ulrika By? Kontakta mig för att boka ett möte.

→ [Här kan läsa en sammanfattning om vad som sades om ämnet på World Congress on ADHD.](#)

Referens:

1. Deberdt W, et al. Prevalence of ADHD in nonpsychotic adult psychiatric care (ADPSYC): A multinational cross-sectional study in Europe. BMC Psychiatry 2015; 15: 242

FOCUS ADHD – interaktiva patientfall



Staffan är 34 år och arbetar som fotograf.

För dig som arbetar inom psykiatri och träffar patienter med ADHD har vi tagit fram FOCUS ADHD.

FOCUS ADHD är interaktiva utbildningar där vi tillsammans går igenom fiktiva patientfall med fokus på ADHD och andra samsjukliga psykiatriska tillstånd. Utbildningen är framtagen av en av Sveriges ledande experter med stor klinisk erfarenhet av ADHD. Ämnesområdena illustreras med patientfall för att skapa hög grad av aktivt deltagande. Fokus ligger på situationer och områden som kan upplevas som utmanande för dig som arbetar kliniskt med ADHD. Utbildningen genomförs på plats på kliniken.


→ [Boka möte med mig för utbildning](#)

Många unga vuxna avslutar sin ADHD-behandling

I samband med övergången från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri slutar många patienter att ta sin läkemedelsbehandling. Detta kan spegla att behovet av kontinuitet i vården för denna patientgrupp inte är tillgodosett.¹

Under European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) som hölls i Barcelona 7–10 oktober 2023, presenterade dr MaiBritt Giacobini med fler en studie där man tittat på övergången från barn- till vuxenpsykiatrisk vård.

Andelen patienter med ADHD-läkemedel minskade avsevärt med åldern.



→ [Här kan du läsa en kort sammanfattning av studien.](#)

Referens:

1. Giacobini et al., Discontinuation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Medication During Transition From Paediatric to Adult Psychiatric Care in Sweden: A Population-Based Study. Abstract P0033, ECNP 2023

Elvanse® lisdexamfetamin

Dospåsar vid behov

Du vet väl att du kan förskriva Elvanse som ett dosdispenserat läkemedel vid behov. På så sätt kan du underlätta för patienten och få en bättre följsamhet.

→ [Läs mer om Elvanse här](#)

Ladda ner patientstöd

På vår hemsida [adhdvarden.se](#) kan du ladda ner hjälpmedel som underlättar i vardagen för den som har ADHD. Här hittar du olika checklistor, scheman, lappar för uppmärkning och mycket mer – för både barn och vuxna.

→ [Gå till patientstöd](#)

ACCESS adhd

Aktuella webinarer

ACCESS ADHD är våra interaktiva webbföreläsningar som rör aktuella ämnen inom ADHD. Här kan du ta del av både kommande och tidigare inspelade webinarer. Bland annat ett webinar om "ADHD och uppföljning av vuxna patienter" eller "ADHD and substance use disorder".

Alla föreläsningar är kostnadsfria.

→ [Ta mig till ACCESS ADHD](#)



SFBUP-kongressen 2024

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri anordnar SFBUP-kongressen som går av stapeln 18–19 april 2024 på Södra Teatern, Stockholm. Årets tema är "Den komplexa patienten".



SPK 2024

Mellan 13 och 15 mars 2024 hålls Svenska Psykiatrikongressen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Preliminärt program presenterades av SPK under november.

❖ Beroendeframkallande medel.

lakttta största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) 20/30/40/50/60/70 mg hårda kapslar. **Farmakoterapeutisk grupp:** Centralt verkande sympatomimetika. **ATC-kod:** N06BA12. **Rxs, särskild receptblankett krävs. (F)**
Subventionsbegränsning: Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Indikation: Elvanse är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling med Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder och risk för missbruk, felanvändning eller avvikande användning. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot sympatomimetiska aminer eller mot något hjälpämne, samtidig användning av monoaminoxidas (MAO)-hämmare eller inom 14 dagar efter att dessa läkemedel har satts ut på grund av risk för hypertensiv kris, hyperthyroidism eller tyreotoxikos, agitationstillstånd, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, avancerad arterioskleros, måttlig till svår hypertoni samt glaukom. **Varningar och försiktighet:** Missbruk och beroende, kardiovaskulära biverkningar, psykiska biverkningar, tics, långsiktig tillväxthämning (längd och vikt), kramper, synstörningar, förskrivning och utlämning samt användning tillsammans med andra sympatomimetiska läkemedel. Elvanse bör endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret. Elvanse ska inte användas under amning. Kan ha en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, då Elvanse kan orsaka yrsel, dåsighet och synstörningar inklusive akkommodationssvårigheter och dimsyn.

För fullständig information och priser, se [www.fass.se](#).

Datum för översyn av produktresumé: 2023-07-28

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, [www.takeda.se](#).

C-ANPROM/SE/ELVS/0042

Date of preparation: November 2023

Takeda Pharma AB

08-731 28 00 | infosweden@takeda.com

